

## 本院不宜剝半或磨粉之藥品

腸溶劑型 Enteric-Coated Forms	
Aspirin	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Bisacodyl	不可磨粉/嚼碎，建議使用其他軟便劑
Broen-C	不可磨粉/嚼碎
Doxycycline	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Duloxetine	不可打開膠囊/磨粉
Esomeprazole	可用冷開水溶解
Mesalazine	不可磨粉/嚼碎
Omeprazole	可打開膠囊服用，微粒不可咬嚼或壓碎
Pantoprazole	不可剝半/磨粉
Sulfasalazine	不可磨粉/嚼碎
Stazyme	不可磨粉/嚼碎
持續釋放劑型 Sustained Released Forms	
Depakine Chrono 500mg	可剝半，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Valproic acid solution
Diltiazem 180 mg	建議使用 Amlodipine/lacidipine
Dihydroergotamine	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Ergoton
Doxazosin	建議使用 Terazosin
Indapamide	建議使用其他利尿劑
Isorsobide-5-mononitrate	可剝半，不可磨粉/嚼碎，建議使用 Nicorandil
Linicor	不可磨粉/嚼碎，建議使用其他降血脂藥
Metformin (緩釋劑型)	建議使用直接釋放劑型
Mirabegron	建議使用 Propiverine
Nifedipine 30 mg	建議使用 Amlodipine
Oxybutynin	可剝半，不可磨粉/嚼碎
Pentoxifylline	可剝半，不可磨粉/嚼碎
Ropinirole 2mg	不可磨粉/嚼碎，建議使用 Ropinirole 1mg
Tamsulosin	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Theophylline	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Venlafaxine	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Xigduo	不可磨粉/嚼碎，建議使用單方製劑
其它不宜磨粉之藥品	
Acetylcysteine 600mg	溶於 60-100 mL 的白開水再服用
Alendronate	具刺激性，導致上腸胃道粘膜受損
Azathioprine	為免疫抑制劑，若須磨粉應有防護裝備及避免懷孕人員操作
Benzonatate	軟膠囊劑型，會造成口腔黏膜麻醉
Calcitriol	軟膠囊劑型，將膠囊刺破取出藥物與水混合後使用
Dimotil	不可剝半/磨粉
Dutasteride	具刺激性，不可咀嚼或打開膠囊

Epclusa	不宜剝半/磨粉，因本品帶有苦味
Fluconazole 50,150mg	不可剝半/磨粉
Glyxambi	可磨粉不宜剝半，建議使用單方製劑
Maviret	不可剝半/磨粉
Methotrexate	有細胞毒性，若須磨粉應有防護裝備及避免懷孕人員操作
Nitroglycerin	舌下錠
Normacol Plus	不可嚼碎/磨粉
Odefsey	不可剝半/磨粉
Paxlovid	不可剝半/磨粉，可分開製備懸浮液給予管灌
Pinaverium	不可口含或咀嚼，以免導致食道損害
Propafenone	苦味及口內麻木感
Progesterone	軟膠囊劑型，將膠囊刺破取出藥物與水混合後使用
Qtern	不可剝半/磨粉，建議使用單方製劑
Rivastigmine	可打開膠囊，不可磨粉/嚼碎
Sevelamer	遇水膨脹，不可磨粉/嚼碎
Strocaïne	刺激粘膜，產生口內麻木感

注意事項	<p>1. 懷孕分級為 X 之藥品</p> <p>(1) 應避免由懷孕人員操作或應有防護裝備。</p> <p>(2) 若須磨粉建議處理方式：</p> <p>◎溶解:將藥品整個浸泡在可以密封的容器，必要時搖晃加速溶解。</p> <p>◎搗碎:將藥品置於厚實的透明塑膠袋內，搗碎後加水成為液態，以避免藥品粉末飛散或外濺。</p>
每年修訂	<p>1.系統管控：①不可為”非整粒”開立②開立磨粉時會鎖控 (for 醫師)</p> <p>2.藥袋提示 (for 病人)</p> <p>3.藥名註記不可磨粉 (for 醫療人員)</p> <p>4.【不可磨粉】貼紙 (for 藥師、護理師)</p>