

表三：乾粉製劑溶解後保存期限

藥品	室溫 (15~30°C)	冷藏 (2~8°C)	藥品	室溫 (15~30°C)	冷藏 (2~8°C)
Acyclovir	立即使用	—	Flomoxef	6小時	1天
Amphotericin B	1天	7天	Hydrocortisone	避光3天	—
Ampicillin	1小時	—	Meropenem	6小時	1天
Augmentin	4小時	—	Methylprednisolone	2天	—
Brosym	6小時	2天	Micafungin	1天	—
Cefazolin	2天	4天	Oxacillin	3天	7天
Cefepime	1天	7天	Pantoprazole	12小時	—
Ceftaroline	立即使用	—	Parecoxib	立即使用	—
Ceftriaxone	6小時	1天	Penicillin G Benzathine	立即使用	—
Cefuroxime	1天	2天	Piperacillin	1天	2天
Clarithromycin	—	1天	Rocuronium	1天	—
Colistin	7天	14天	Somatropin	—	28天
Daptomycin	12小時	2天	Streptomycin	避光7天	—
Doripenem	NS為溶劑12小時	1天	Tazocin/Pisutam	1天	7天
	D5W為溶劑4小時	1天	Teicoplanin	—	1天
Esomeprazole	立即使用	—	Vancomycin	—	14天

表四：稀釋後24小時內使用(排除抗生素)

Atracurium	Heparin
Dobutamine	Labetalol
Furosemide	Midazolam
Pantoprazole (12hr內使用)	