

一、緩解症狀藥物：

忘了服藥沒有關係，於下一次正確的時間服用一次的藥量，請不要服用雙倍的劑量。例如：止痛藥、止咳藥等。

二、治療性藥物，如高血壓藥、降血脂藥等。

1. 若是在兩次服藥時間中點以前，想起即可補吃一次藥量。如果已超過兩次服藥時間中點，此時不建議補服，於下一次正確的時間服用一次的藥量。
2. 若已經接近下次服藥時間，就不需補服，並於下一次正確的時間服用一次的藥量。請不要服用雙倍的劑量，以免過量可能發生危險。

三、特殊藥物：

* 強心劑(Digoxin 毛地黃)：

距離漏服藥物時間在 12 小時內立即補服當日藥量，超過 12 小時不須補服當日藥量，隔日正常服藥。若忘記服藥超過兩天，請回診並告知醫師。

* 抗凝血劑(Warfarin 華法令)：

距離漏服藥物時間在一天內立即補服當日藥量，超過一天不須補服當日藥量，隔日正常服藥。若忘記服藥超過兩天，請回診並告知醫師。

* 抗癲癇藥：

忘記服藥時應儘快補服，若已接近下次服藥時間，除非醫師另有指示，否則不補服，連續兩天忘記服藥者須儘快就診。

* 骨質疏鬆治療劑(Fosamax 福善美 70mg)：

忘記服藥想起後的早晨服用一顆，切記同一天不得服用兩顆，接下來按原定每週用藥日每週服用一顆。

* 類固醇藥物：

j 每天服用者：忘記服藥想起時應立即補服，接近下次服藥時間，可跳過不服，不必服用雙倍量。

k 每隔二天服用者：忘記服藥想起時應立即補服；若隔日才想起，亦儘快補服，接下來的給藥時間也順延一天。

* 複方荷爾蒙類藥物(如 Activelle 雅利妃錠，Trisequens 特利順錠)

忘記服藥想起時應立即補服，接近下次服藥時間，可跳過不服，不必服用雙倍量。若忘記服藥超過兩天，請回診並告知醫師。

四、若忘記服藥時可諮詢藥師或參考藥品說明書。