

糖漿藥品使用須知

一、水劑糖漿：

1. 請將瓶口密封，連同藥袋儲存於避光陰涼處(室溫 15~25°C)。
2. 藥品應放置於兒童無法取得之處。
3. 本院藥品：Acetaminophen(安佳熱)、Secorine(息咳寧)、Peace(鼻福)、Theophylline(舒喘)、Liquid Brown Mixture(乾咳化痰劑)

二、口服懸浮液糖漿：

1. 每次使用前請充份搖勻。
2. 請將瓶口密封，連同藥袋儲存於避光陰涼處(室溫 15~25°C)。
3. 藥品應置於兒童無法取得之處。
4. 本院藥品：Kaolin(高克痢)

三、粉末劑型糖漿：

1. 首次使用請加入冷開水後用力搖勻，泡製成口服懸服液。
2. 每次使用前請充份搖勻。
3. 請密封避光儲存。
4. 藥品應置於兒童無法取得之處。
5. 本院藥品泡製方法及儲存：

藥名名稱	加入水量	泡製後之總量	使用期限	儲存溫度
Amoxicillin (萬博黴素)	50ml	60ml (加至瓶身箭頭高度)	7 天	冷藏
Augmentin (安滅菌)	92ml	100ml (加至瓶身箭頭高度)	7 天	冷藏
Zithromax (日舒)	9ml	15ml	10 天	室溫