

肛門栓劑使用須知

使用方法：

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 將栓劑除去鋁箔或塑膠外包裝後，將栓劑尖端在微溫的水中潤濕或在前端塗些凡士林。
3. 側躺將另一側膝蓋提起靠近胸部，用單手把臀部向上拉，露出肛門口，用手指將栓劑由較圓滑的一端塞入肛門。
4. 將栓劑輕輕推入肛門，成人約 3 公分，兒童約 2 公分。
5. 夾住兩臀，因為此時會有想將栓劑排出的反應。
6. 保持原來姿勢躺 15 分鐘。
7. 栓劑變軟無法塞入時，可將栓劑放置冰箱冷藏約 30 分鐘使其變硬。
8. 使用後將雙手洗淨。

注意事項：

1. 使用藥物之前，應先檢查藥品是否出現變色或異常的沈澱現象，若有變質則應丟棄不要使用。
2. 出現過敏或刺激性反應，應停止使用藥物並告知醫師。
3. 確實遵照醫師指示，於正確的時間、正確的期間內使用藥品。

儲存：

1. 藥品應避免陽光照射。
2. 藥品不要放於溼氣高的地方(例如:浴室)，以免藥品遭熱氣或濕氣破壞。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 過期藥品不要再使用，而且須丟棄於小孩拿不到的地方。
5. 請將藥品連同藥袋妥善保存。

