

口服降血糖藥物-Repaglinide

【藥品名稱】 Novonorm、Relinide

【藥品作用】 口服抗糖尿病藥物，治療第二型糖尿病。

【注意事項】

1. 依照醫師處方劑量定時服藥，未用餐則不需服藥。
2. 服藥時間為飯前 30 分鐘內，服藥後應儘快進食。
3. 忘記服藥的處理：忘記服藥時不需補服；下次用餐前依正常劑量服用，不能服用雙倍藥量。
4. 服藥期間請勿飲酒。
5. 服藥期間若有眩暈、嗜睡或視力模糊現象，請避免開車或操作機械。
6. 藥物的副作用及處理方式：
 - ①低血糖(如饑餓感、暈眩、出汗、顫抖、頭痛、意識模糊等症狀)：意識清楚時，請進食葡萄糖的糖果或飲料；若意識不清，應立即就醫。
 - ②若胃腸不適、腹瀉、便秘症狀持續，就醫時應告知醫師。
 - ③如有皮膚或眼睛變黃、尿液顏色變深，請立即就醫。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123