

## 口服降血糖藥物-Sulphonylurea

【藥品名稱】 Glimepiride、Glipizide。

【藥品作用】 口服抗糖尿病藥物，治療第二型糖尿病。

### 【注意事項】

1. 依照處方劑量定時服藥，服藥時間為餐前 30 分鐘。
2. 服藥期間須禁食進行臨床診療時，請詢問醫師是否須停用藥物。
3. 服藥期間請勿飲酒。
4. 服藥期間從事戶外活動時請注意防曬。
5. 服藥期間若有眩暈、嗜睡或視力模糊現象，請避免開車或操作機械。
6. 忘記服藥的處理：想起時應儘快補服，若已接近下次服藥時間不需補服；下次服藥時間依正常劑量服用，不能服用雙倍藥量。
7. 藥物的副作用及處理方式：
  - ①低血糖(如饑餓感、暈眩、出汗、顫抖、頭痛、意識模糊等症狀)：意識清楚時，請進食葡萄糖的糖果或飲料；若意識不清，應立即就醫。
  - ②若胃腸不適、腹瀉、便秘症狀持續，就醫時應告知醫師。
  - ③如有皮膚或眼睛變黃、尿液顏色變深，請立即就醫。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123