

Fentanyl Patches (吩坦尼穿皮貼片)

【含量】 每片 10 cm² 含 fentanyl 2.5 mg (25 mcg/小時)

【藥品作用】

類鴉片止痛劑。

【適應症】

需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

【用法】

1. 使用前才撕開包裝袋，再撕開貼片黏貼層。
2. 黏貼於適當部位(如前胸、後背、上半臂或大腿體毛較少部位)。
3. 以手掌緊壓 30 秒，使貼片完全平貼於皮膚上，尤其是貼片邊緣位置。
4. 使用後以清水洗手，勿使用肥皂或其他清潔用品。
5. **【使用紀錄表】** 記錄貼上貼片日期時間。
6. 每片可使用 72 小時，依醫生指示更換貼片，新貼片需黏貼不同部位。
7. 舊貼片對折黏貼面後放回原包裝袋，記錄撕下貼片的日期時間，下次回診時連同 **【使用紀錄表】** 一併繳回藥局。

【忘記用藥時的處理】

若忘記用藥，請於想起來時貼一次劑量，不可一次貼兩次的劑量，再依醫師處方間隔時間更換貼片。

【注意事項】

1. 請避開傷口及放射線治療部位，若無法避免有體毛部位，可用剪刀剪除，不可用剃刀刮除。
2. 應以清水清潔黏貼部位待完全乾燥後即可貼上。勿使用肥皂或其他清潔用品，不可塗抹乳液及其他含油脂擦劑。
3. 避免泡熱水澡或將貼片直接接觸熱源(熱水袋、電毯)。
4. 發燒時會增加藥物的吸收，需監測副作用的產生，並告知醫師。
5. 若有噁心、嘔吐、嗜睡或呼吸困難等不舒服狀況，請告知醫師。
6. 貼片破損時勿使用，不可裁剪或切割貼片。
7. 貼片在使用後 12-24 小時可產生止痛效果，使用期間若仍感疼痛應告知醫師，以便調整劑量。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123