

# 陰道栓劑使用須知

## 使用方法：


1. 用肥皂及清水徹底清潔雙手。
2. 先將栓劑前緣塗乳液或凡士林，或沾點溫開水潤滑，有助推入陰道栓劑。  
\*徒手給藥法：採仰臥姿勢，兩腿曲起向外張開，用食指及中指把陰道錠輕推入陰道口，放妥後，輕輕將藥粒用手指推送入陰道深處 3-5 公分即可，避免滑出。  
\*送藥器給藥法：將栓劑較小的一端放入送藥柱之杯形尾端，曲腿將送藥柱插入陰道，而深度只要能順利插入即可，然後輕輕的壓送藥柱以使栓劑推送入陰道後，將送藥柱從陰道取出。
3. 栓劑置入陰道後數分鐘內保持躺姿，不要站起或走動，因此使用最佳時間為睡前。
4. 使用後用肥皂及清水徹底洗淨雙手及送藥器。

## 使用注意事項：

1. 若栓劑已經軟化無法塞入時，可將栓劑放置冰箱冷藏約 30 分使其變硬。
2. 除非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用。若妳已經懷孕或近期內打算懷孕，請告知醫師。
3. 若使用後病情惡化或有搔癢、刺激感時，應立即告知醫師。
4. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治，否則可能會復發。
5. 使用後如有少量黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，可在內褲底部墊上衛生棉墊，勿進行陰道之沖洗。

## 藥品之儲存：

1. 請將藥品連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。



1. 由塑膠片上撕開一個
2. 由指示處撕開塑膠後取出
3. 用食指輕按栓劑之底部，再插入陰道內